

スマイル40 プレミアム

眼科用薬

ご使用に際して、この説明文書をご
必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう
大切に保存してください。

年齢や目の酷使による
眼疲労、目のかすみ
の有効成分
10種の「効く」



- ・涙の安定化 ▶ ① ビタミンA (35,000単位)
 ・角膜の保護 ▶ ② コンドロイチン
 硫酸エステルナトリウム



- 栄養補給
●新陳代謝促進
- ③ ビタミンE
 - ④ ビタミンB₆
 - ⑤ タウリン
 - ⑥ L-アスパラギン酸
カリウム



- **ピント調節** ▶ **ネオスチグミンメチル硫酸塩**
 ● **かゆみ抑制** ▶ **クロルフェニラミンマレイン酸塩**
 ● **炎症鎮静** ▶ **イブuprofen アミノカプロン酸**
 ● **充血除去** ▶ **塩酸テトラヒドロゾリン**

スマイルの独自技術により防腐効果を持っています。

スマイル 防腐剤無添加  **検索**

防腐剤（ベンザルコニウム塩化物など）を配合していません。
使用期間や保管方法が従来製品に比べてお使いいただけます。

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
- (4) 次の診療を受けていた人。婦人科

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみで痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 目のかすみ改善されない場合。
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

●効能


- 目の疲れ
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 結膜充血
- 目のかゆみ
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 雪盲(雪その他の光線による眼炎)
- 紫外線(など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にはのみ使用してください。
- 
- 点眼の先を下向きに点眼



容器の先を下に向けて点眼

●成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
レチノール(ビタミンA)	35,000単位	角質に働きかけ、目の機能を活性化させる
肝臓d-αトコフェール(天然型ビタミンE)	0.05g	目の老化を促して、栄養を目に供給するビタミンです。
ビロキシン酸塩(ビタミンB6)	0.03g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.05g	うるおいを保ち角膜を保護します。
タウリン(栄養成分)	0.1g	新陳代謝を促す作用があるアミノ酸類です。
ヒアルロン酸ナトリウム(栄養成分)	0.2g	目の乾燥を取り除くアミノ酸類です。
ネオオクタジミンタリウム硫酸塩	0.005g	目のビタミン調節機能を改善します。
クロロフェニルメチンタリウム硫酸塩	0.03g	目の充血を抑えます。
塩酸テトラヒドロコリン	0.01g	目の炎症を鎮めます。
イソペンチンアミンカプロン酸	1.0g	

添加物として、ホウ酸、トクメタモール、エデト酸Na、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、等張化剤、pH調整剤を含む。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼(ガーリ)保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーで軽く拭き取ってご使用ください。

—お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
 ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752
 〒111-8644 東京都台東区橋本1-3-28
 受付時間 9:00~17:00(土、祝日を除く) 0123