

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

製品情報はこちらから
キッズバファリン鼻炎シロップS 検索

BUFFERIN

お子さまの鼻炎の諸症状の緩和に。

第2類医薬品

鼻炎薬 キッズバファリン鼻炎シロップS

バファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の有効成分はアセチルサリチル酸(アスピリン)ではありません。
医師、薬剤師又は登録販売者に相談する場合は、非アスピリン製剤とお伝えください。

「キッズバファリン鼻炎シロップS」は、3ヶ月から11才未満のお子さま用のシロップタイプの鼻炎用内服薬です。
2種類の有効成分(クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩)と自然の生薬エキス(サイシン流エキス)が急性鼻炎や花粉などのアレルギー性鼻炎の諸症状を緩和します。

- お子さまの大切な眠りをさまたげない、ノンカフェイン処方です。
- コデイン(麻薬成分)を含んでいません。
- アレルギー性の鼻炎にも効果があります。
- 小さなお子さまでもののみやすい、いちご味のシロップです。
- お子さまの誤飲を防ぐ、安全キャップを採用しています。

△ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

3. 長期連続して服用しないでください

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人の。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気
- 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量

次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。
約4時間の間隔をおいて、場合により1日6回まで服用して差し支えありません。


年 齢	7才以上 11才未満	3才以上 7才未満	1才以上 3才未満	6ヵ月以上 1才未満	3ヵ月以上 6ヵ月未満	3ヵ月未満
1回量	10mL	6mL	5mL	4mL	3mL	服用しないこと X

＜用法・用量に関する注意＞

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- 用法・用量を厳守してください。

●1回の服用量

7才以上11才未満
3才以上7才未満
6ヵ月以上1才未満
1才以上3才未満
3ヵ月以上6ヵ月未満



●注ぎ方

計量カップのフチにボトルの口をあてて注いでください。ボトルを離して注ぐと、ボトルの口もとにシロップがたれ、それが固まるとキャップが開かなくなることがあります。

成 分(60mL中)

有効成分	含 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどのアレルギー症状をやわらげます
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	55mg	鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりをしめます
サイシン流エキス(原生薬換算量0.2g)	0.2mL	抗アレルギー作用により、鼻みず・鼻づまりなどの症状をやわらげます

添加物として白糖、グリセリン、カラメル、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、エチルバニリンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になつたり品質が変わります)。

(4) 計量カップは、使用後水洗いなどして、清潔に保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(6) 本品には生薬エキスが配合されているため、まれに微混濁が生じる場合がありますが、効果には変わりありません。

(7) キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯(50~60°C)に2~3分つけると開けやすくなります。


■安全キャップの使用法

■安全キャップのあけ方

①キャップを強く押し
ながら②矢印の方向
に回してあけます。
※テープの上に
置いてから押すと、
力を入れやすくなります。

■安全キャップのしめ方

ボトルの口の周囲を
よく拭いてから、
普通のキャップを
しめる要領で
しっかりしめて
ください。



■お問合せ先 お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター [0120-813-752]
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28