

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

目薬 スマイルピット ドライアイ

うるおい持続、疲れた瞳を冷たく癒す
超清涼感が持続する高機能目薬

こんな症状に優れた効き目を発揮する。
「目の表面が乾く」「目が疲れる」「目がかすむ」など

超爽快・高機能目薬「スマイルピット ドライアイ」の特徴

うるおいを角膜表面に長く保持させる。

涙液補助成分配合。保水性の高い処方設計をしているので、涙の蒸散を防ぎ、潤いが長持ちする。

角膜保護成分が、負担をかけた瞳を癒す。

角膜保護成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」が乾燥によってダメージを受けた角膜表面に効果的に働き、疲れ目をやわらげる。

アミノ酸成分が目の新陳代謝を促進する。

「タウリン」「L-アスパラギン酸カリウム」の新陳代謝促進作用で、疲れた瞳に優れた効果を発揮する。

点眼直後の超清涼感が長続きする。

刺激的な清涼感で気分爽快。

【ツイスト キャップの開閉方法】

キャップ部分を上にして開閉してください。

※ 容器の中心を押さえたまま開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。
容器の側面をもって開閉してください。

① 開け方

キャップを手前
にひねります

② 閉め方

カチッと音が
するまでまっすぐ
押し下げます

△使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみ、痛み

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

● 効能


目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります)。また、湿潤したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分 (100mL中)

有 効 成 分	含 量
リン 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム 水 和 物	1.52g
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5g
L-アスパラギン酸カリウム	0.1g
タウリン	0.1g

※ 添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ヒアロン酸Na、エデト酸Na、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、L-メントール、dl-カンフル、ユーカリ油、pH調整料を含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※ この目薬は、携帯袋を入れておりません。

■ お問い合わせ先
お問い合わせのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター (020-813-7522) ライオン株式会社
〒111-8644 東京都台東区駒形1-3-28
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日も除く)

0123