

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイル40 プレミアムザ・ワン クールMAX

眼科用薬 第2類医薬品

スマイル40 プレミアムTHE ONE

眼疲労 眼かすみ 眼充血 眼かゆみ の共通原因のひとつ

角膜ダメージを修復するビタミンA配合

これらすべての症状を1本で治す!

国内(基準※2内)最多12種の有効成分配合

原因アプローチ × 症状アプローチ

※1 軽微なごすれによる

※2 基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

防腐剤無添加

スマイルの独自の技術により防腐効果を保持していても、防腐剤（ベンザルカニオン塩）や防腐剤由来の成分を配合していません。使用前後や保管力なども防腐剤配合の目薬と同等にお使いいただけます。

消滅感レベル

目薬の量、クール感

01234567

クールMAX

●点眼方法について

容器の先を鼻下に向けて点眼してください。
傾けたまま点眼すると、キャップを開けたときに容器の先に残った液が垂れることがあります。液がキャップや容器の先についていた場合には、清潔なガーゼ等で軽くふき取ってからキャップを開けてください。

△ 使用上の注意

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位 症 状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

目 充血、かゆみ、はれ、しみ、痛み

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 目のかすみ改善されない場合。
(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

その他の注意

粘度の高い成分を配合しています。使用後、一時的にかすみでみえる場合があります。必ずで注意してください。

●効能

●目の疲れ

●目のかすみ(目やにの多いときなど)

●結膜充血

●目のかゆみ(目など)

●眼瞼炎(まぶたのただれ)

●ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。
(用法・用量に準拠する注意)

(1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導・監督のもとに使用させてください。

(3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。

(4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(5) 点眼用のみ使用してください。

●成分(100mL中)			
有 効 成 分	含 量	はたらき	
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)	50,000単位	角膜炎・瞼炎、角膜上皮の修復を促すビタミンです。	
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.045g	血行を促進して、栄養を目に供給するビタミンです。	
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.01g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1g	うるおいを保ち角膜を保護します。	
タウリン	1g	新陳代謝を促す作用があるアミノ酸類です。	
ヒアスチランゲン糖カリウム	0.8g	目に酵素を取り込むアミノ酸類です。	
ネオオキサジミンナトリウム塩酸塩	0.005g	目のピント調節機能を改善します。	
クロロフェニラミンナトリウム塩酸塩	0.03g	目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。	
塩酸チトラヒドロンリン	0.02g	目の充血を抑えます。	
イブプロフェンナトリウム塩酸塩	1g	目の炎症を鎮めます。	
ペルベリン塩化物水和物	0.015g	抗菌・抗炎症作用のある生薬由来の成分です。	
グリチルリジン酸二カリウム	0.25g	抗炎症作用のある生薬由来の成分です。	

※1 効能として、本剤はトロンボキサン受容体拮抗薬、プロスタグランジン合成阻害剤、ヒドロコルチゾン、ピロキシカマドール、タウリン、ヒアスチランゲン糖カリウム、クロロフェニラミンナトリウム、イブプロフェンナトリウム、ペルベリン塩化物水和物、グリチルリジン酸二カリウム、酢酸トコフェロール、ピリドキシン塩酸塩、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、レチノールパルミチン酸エステルを配合しています。

●保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になりたり品質が変わります)。

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。
その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

(7) 液色は生薬由来の成分を配合しているため黄色です。衣類などにつくと着色することがありますので、つかないようによく注意してください。

(8) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。
透明フィルム開封後は脱酸素剤を捨ててください。

◇ 自然環境に配慮し、排棄袋は入れておりました。

お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752

ライオン株式会社 011-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

0324

近 視 眼 薬

LION 添付文書集 2025

77