

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬

第2類医薬品

Smile[®]

さわやかな さし心地の目薬

スマイルA

疲れ目・充血に

「スマイルA」はさわやかなさし心地の目薬です。家にいれば、テレビや読書、そして一歩外に出れば、スモッグや車の運転…と、毎日の生活の中で、目は知らず知らずのうちに酷使されがちです。こんな時は適度の休養と、目の健康を保つ目薬が有効です。目が疲れたり、充血したり…そんな時は「スマイルA」をお使いください。「スマイルA」は主薬に、目の新陳代謝を促進するL-アスパラギン酸カリウムを配合。疲れ目や充血にすぐれた効果をあらわします。また、点眼すると目にさわやかな清涼感がひろがります。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
緑内障
(4) 次の診断を受けた人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみ改善されない場合。
(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみ、痛み

● 効能

目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください（汚染や異物混入（目やにやほこり等）の原因になります。）。また、湿潤したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。

● 成分（100mL中）

有 効 成 分	含 量
L-アスパラギン酸カリウム	1.0g
アラントイン	0.1g
ナファゾリン塩酸塩	0.003g

* 添加物として、ホウ酸、クエン酸、クエン酸Na、プロピレングリコール、クロロブタノール、α-ボリンネオール、L-メントールを含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になりたり品質が変わります。）。
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限（外箱の底面に書いてあります）の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

◇ 自然環境に配慮し、携帯袋は入れておられません。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く） 0123