

項目	内容				
医薬品区分	一般用医薬品				
薬効分類	殺菌消毒薬（特殊紺創膏を含む）				
承認販売名	ミルトン				
製品名	ミルトン				
製品名（読み）	ミルトン				
製品の特徴	安心 チャイルドプルーフキャップ採用 簡単 浸けておくだけでOK すすぐなくてもOK 溶液の交換は1日1回を目安に				
使用上の注意	<p>使用上の注意</p> <p>■相談すること</p> <p>(1)本剤をあやまって飲みこんだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、医師に相談してください。</p> <p>(2)目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医に相談してください。</p> <p>(3)ミルトン溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>その他の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本剤は飲まないでください。 ●小児の手の届かない所に保管してください。 ●手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。 				
効能・効果	次の消毒・殺菌 哺乳びん、乳首 手指、皮ふ ガーゼ、包帯、衛生器具等 器具等				
効能関連注意					
用法・用量	哺乳びん、乳首：約80倍にうすめ、1時間以上浸す。 手指、皮ふ：約20倍にうすめて用いる。 ガーゼ、包帯、衛生器具等：約10-50倍にうすめ、15分以上浸す。 器具等：約80倍にうすめ、1時間以上又は約10-50倍にうすめ、15分以上浸す。				
用法関連注意	(1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)シアヌル酸系の製品、酸性の洗浄・漂白剤などとの混合は危険ですので避けてください。 (3)金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ・スプーンなどの金属製品や、指輪など貴金属をミルトン溶液につけることも避けてください。メラミン食器などには、本剤の使用を避けてください。 (4)調製後、ミルトン溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。				
成分分量	<p>濃度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>次亜塩素酸ナトリウム</td><td>1.1W/V%</td></tr> </tbody> </table>	成分	分量	次亜塩素酸ナトリウム	1.1W/V%
成分	分量				
次亜塩素酸ナトリウム	1.1W/V%				
添加物	添加物としてpH調節剤を含有します。				
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 (2)誤用の原因になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないでください。 (3)衣類などにつくと脱色、変色することがありますので注意してください。 (4)殺菌消毒する製品によっては印刷面（文字、絵）、材質などが変色・変質することがあります。				
消費者相談窓口	【製品お問い合わせ窓口】 0120-093610				
製造販売会社	杏林製薬株式会社 添付文書情報：J0601011250_06_A.pdf 東京都千代田区大手町一丁目3番7号				
販売会社					
剤形	液剤				
リスク区分	第2類医薬品				