

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

外用鎮痒消炎剤

キンカン[®]PVA EX液

■ 特 徴 ■

- ◎11種類の成分で、つらいかゆみ・炎症にしっかり効きます。
 - ・抗炎症：プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)、グリチルレチン酸、サリチル酸グリコール
 - ・かゆみ止め：ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、ジブカイン塩酸塩
 - ・皮膚の修復：アラントイン
 - ・殺菌：イソプロピルメチルフェノール
 - ・清涼感：dl-カンフル、l-メントール
 - ・血行促進：トコフェロール酢酸エステル
- ◎PVA(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)は患部で優れた抗炎症作用を発揮し、その後体内に吸収されると作用の穏やかな物質に分解されるアンテドラッグステロイドです。
- ◎ひんやりさわやかでさらっとした使用感の液剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能又は効果 ■

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

■ 用法及び用量 ■



- 1 日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

◆使用方法

- ①ご使用前にボトルを上向きにし、キャップをとりはずしてから、スポンジ中央を数回押してください。中の空気が抜け、液の出過ぎを防ぐことができます。(図1)
- ②患部を清潔な状態(汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態)にしてください。
- ③スポンジを患部に軽く押し付け、液をふくませてから塗ってください。(図2)
※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



■成分及び分量■(100mL中)

成 分	分 量	成 分	分 量
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15 g	イソプロピルメチルフェノール	0.10 g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.00 g	ジブカイン塩酸塩	0.25 g
クロタミトン	5.00 g	dI-カンフル	1.00 g
グリチルレチン酸	0.30 g	l-メントール	3.50 g
サリチル酸グリコール	1.00 g	トコフェロール酢酸エステル	0.50 g
アラントイン	0.20 g		

添加物としてエタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、プロピレングリコール、BHT、乳酸、乳酸ナトリウム液を含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓し立てて保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、床や家具等の塗装面、化繊製品、皮革製品等に液が付着すると変色・変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

製造販売元 **株式会社 雪の元 本店**
奈良県橿原市大谷町182番地

発売元 **株式会社金冠堂**
東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は以下のお客様相談室までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL:03-3421-6171(代表)

受付時間:9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

火気厳禁