

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

Santen

第2類医薬品

目のかゆみに最強の爽快感*

サンテFX AL 目薬

サンテFX ALは最強の爽快感*で目のかゆみをすっきりクリアにする目薬です。アレルギーの発生を原因からブロックすると共に、かゆみの元となるヒスタミンをブロックして炎症を抑えます。

最強の爽快感*が瞳に冴えたり、働き続けるあなたの瞳をサポートします。

*当社製品内で最も高い清涼感レベル

⚠ 使用上の注意

✖️ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。(眼気等があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人

(3) 妊婦または妊娠していると思われる人

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人：はげしい目の痛み

(6) 次の診断を受けた人：緑内障

(7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。

●片方の目だけに症状がある場合 ●目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合 ●視力にも影響がある場合

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

(1) 目のかすみが改善されない場合

(2) 2日間使用しても症状が良くならない場合

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持つて医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

用法・用量

1回1~2滴、1日4~6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。



ツイストキャップの開封方法

必ずキャップを上にしてあけてください。

注:容器の中心を押さえたまま開封すると薬液がとびだすことがあります。



効能・効果

花粉・ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和: 目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)


成分・分量

成 分	分 量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1.0%	ヒスタミンなどの放出を抑え、目のかゆみ・目の充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
イブシロン-アミノカプロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。
タウリン	1.0%	目の組織代謝を活発にします。
L-アスパラギン酸カリウム	1.0%	目の組織呼吸を高めます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、d-カンフル、d-ポルネオール、l-メントール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。



包 装 12mL

〔自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。〕

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 0120-127-023
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。