

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

06

胃腸薬

第2類医薬品

胃痛・胃酸逆流などによる胸やけに

第一三共胃腸薬グリーン錠

第一三共胃腸薬グリーン錠の特徴

- ロートエキス3倍散が胃液の分泌を抑制し、胃痛をしずめます。
- 3種の制酸剤が胃酸を中和して胃粘膜を保護します。
- 銅クロロフィリンNa、カンゾウ末が胃粘膜を保護し、あれ・ただれを修復します。
- 健胃生薬成分が弱った胃のはたらきを高めます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
4. 長期連用しないで下さい。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

□のかわき、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

■ 効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ(おくび)
- 胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胃弱
- 飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 食べ過ぎ(過食)、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感



胃痛



胸やけ



むかつき



飲みすぎ

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠	3回 食後に服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2錠	
11 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 11歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は濃緑色～帯黄緑色の錠剤で、9錠中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	360mg	持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護するはたらきもあります。また、合成ヒドロタルサイトは速効性もかねそなえています。
合成ヒドロタルサイト	480mg	
炭酸水素ナトリウム	480mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷ（おくび）などの過酸症状を改善します。
ロートエキス3倍散	90mg	胃液の分泌を抑制し、胃痛をしずめます。
ウイキョウ末	30mg	特異な味や香りをもつ生薬で、おだやかな健胃作用をあらわします。
ケイヒ末	180mg	
チョウジ末	30mg	
ゲンチアナ末	90mg	特異な苦味によって消化液の分泌を増し胃の消化機能を助けます。
センブリ末	5mg	
ビオチンアスターゼ2000	60mg	たんぱく質やでんぷんを分解する複合消化酵素で、胃の消化機能を助けます。
リパーゼAP6	60mg	脂肪消化酵素で胃の消化機能を助けます。
銅クロロフィリンナトリウム	48mg	胃粘膜を保護し、あれ・ただれの修復を助けます。
カンゾウ末	150mg	

添加物：バレイショデンプン、乳糖、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウム（緑色）により、便が緑色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生ずることがあります。また、めれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、ビンを開封した後は、12カ月以内に使用して下さい。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

06



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10