

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

カコナル[®]2



感冒の
初期

鼻かぜ



頭痛

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよ
う大切に保管して下さい。

使用上の注意 相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦
又は妊娠していると思われる人 (3)体の
虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱
い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の
著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬など
により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたこ
とがある人 (8)次の症状のある人:むく
み、排尿困難 (9)次の診断を受けた人:
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに
服用を中止し、この外箱を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こること
があります。その場合は直ちに医師の
診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルド ステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっ ぱり感やこわばりに加え て、脱力感、筋肉痛があらわ れ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮 膚や白目が黄色くなる)、褐 色尿、全身のだるさ、食欲 不振等があらわれる。

3.1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛
に服用する場合には5~6回)服用して
も症状がよくなる場合は服用を
中止し、この外箱を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい。

[効能・効果]

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒
の初期(汗をかいていないもの)、鼻か
ぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の
痛み

[用法・用量]

次の量を朝夕、食前又は食間によく振っ
てから服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事
から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)本剤は1回1本飲みきりです。
- (3)本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

[成分・分量] 90mL(45mL×2本)中
葛根湯濃縮液.....81mL
(下記生薬の水製抽出液)

日局カッコン 8g 日局マ オ ウ 4g
日局タイソウ 4g 日局ケ イ ヒ 3g
日局シャクヤク 3g 日局カンゾウ 2g
日局ショウキョウ 1g

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸
Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、
エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保
管して下さい。(2)小児の手の届かない
所に保管して下さい。(3)他の容器に入
れ替えないで下さい。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります)(4)表示の使用期
限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈お問い合わせ先〉

第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電 話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>