

第2類医薬品

カコナル®



感冒の
初期

鼻かぜ

頭痛

〈お問い合わせ先〉

第一三共ヘルスケア(株)

お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文書を
必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大
切に保管して下さい。

使用上の注意

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

カコナル

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

[効能・効果]

体力中等度以上のものの次の諸症
感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

[用法・用量]

次の量を食間に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)本剤は1回1本飲みきりです。(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいます。よく振ってから服用して下さい。

[成分・分量] 90mL(30mL×3本)中

葛根湯抽出液(下記生薬の水製抽出液)・・・90mL

日局カッコン・・・8g	日局マ オ ウ・・・4g
日局タイソウ・・・4g	日局ケ イ ヒ・・・3g
日局シャクヤク・・・3g	日局カンゾウ・・・2g
日局ショウキョウ・・・1g	

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。