

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

# カコナル<sup>®</sup>2 葛根湯顆粒 [満量処方]

## カコナル2葛根湯顆粒〈満量処方〉の特徴

1. ひきはじめのかぜに1日2回の服用でしっかり効く葛根湯製剤です。
2. 朝・夕1日2回服用タイプなので飲み忘れが少なく、昼間持ち歩く必要がありません。
3. 葛根湯製剤の中でも、日本薬局方葛根湯エキスを全量配合している満量処方です。
4. 葛根湯製剤ですので眠くなる成分を含んでおりません。
5. 本品はお湯に溶かして服用することもできます。

### 「満量処方」とは？

日本薬局方葛根湯25g処方より得たエキスを全量(最大量)配合していることを意味します。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸の弱い人
  - (5) 発汗傾向の著しい人
  - (6) 高齢者
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (8) 次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称           | 症 状                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効 能・効 果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 用 法・用 量

| 年 齢        | 1回量        | 1日服用回数                                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 成人（15歳以上）  | 1 包        | 2 回<br>朝夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用して下さい。またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服して下さい。 |
| 7歳以上15歳未満  | 2/3 包      |                                                                |
| 4歳以上 7 歳未満 | 1/2 包      |                                                                |
| 2歳以上 4 歳未満 | 1/3 包      |                                                                |
| 2 歳 未 満    | 服用しないで下さい。 |                                                                |

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 2歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成 分・分 量

本品は、淡褐色～褐色の顆粒剤で、2包（1包3g）中に次の成分を含有しています。

日局 葛根湯エキス（乾燥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.56g

下記の生薬の水製抽出エキス

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| 日局カ ッ コ ン・・8g | 日局マ オ ウ・・4g | 日局タ イ ソ ウ・・4g |
| 日局ケ イ ヒ・・3g   | 日局シャクヤク・・3g | 日局カンゾウ・・2g    |
| 日局ショウキョウ・・1g  |             |               |


添加物：D-マンニトール、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 0120-337-336  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元  
新生薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町清水谷1269