

腰痛・肩こり 筋肉疲労・筋肉痛
関節痛・ねんざ

保湿チャック付

超薄型

肌に密着して

はがれにくい

パテックス[®] うすぴたシップEX

無臭性

冷感、効く!

第3類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

第一三共ヘルスケア

目立たない!
ベージュ色

縦・横・斜めに
伸縮自在

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

保湿チャック付

〈鎮痛消炎シップ剤〉

1枚サイズ 10cm×14cm

パテックス® うすびたシップEX

鎮痛消炎薬

パテックスうすびたシップEX

特 徴

無臭性・無香料でニオイも気にならず、しかも衣服から透けにくいベージュ色なので、貼っていても目立たない冷感シップです。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) しっしん、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、しもやけ

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN

用法・用量

そのまま、または適当な大きさに切り、表面のフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。

- 〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸グリコール	2g	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。
アルニカチンキ	1mL (原生薬として 0.2g相当)	

添加物：L-メントール、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、カルメロースNa、カオリン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、ケイ酸アルミン酸Mg、pH調節剤、エデト酸Na、その他1成分
[1枚サイズ 10cm×14cm]

※本剤は生薬を配合しておりますので、色調が多少異なることもありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02 登録商標



Daiichi-Sankyo

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2-16-23

開封口