

SEIROGAN
Quick C

服用に際しては、この添付文書（説明文書）を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



大幸薬品

正露丸 クイックC

第2類医薬品

胃腸薬

正露丸 クイックC

正露丸 クイックCは、100年以上前からご家庭で使用されている『正露丸』に配合されている 日本薬局方（日局）木クレオソートがすばやく溶け出す液体カプセルです。日局 木クレオソートはブナやマツなどの樹木から得られる透明な液体の生薬で、腸内の水分バランスを調整し、腸の運動を止めることなく正常化し、効果を発揮します。通勤・通学時や外出先でおこる急な下痢や軟便に、**正露丸 クイックC**での早めの対処をおすすめします。



使用上の注意

相談すること



- 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている方
 - 発熱を伴う下痢のある方、血便のある方又は粘液便の続く方
 - 高齢者（腎臓や肝臓などの生理機能が低下していることが多く、薬剤の作用が強くあらわれることがあります。）
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書（説明文書）を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

（主成分 木クレオソートは多量の服用により胃障害があらわれ、食欲を減退させることがあります。）

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書（説明文書）を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能

下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回を限度とし、必ず水またはお湯といっしょに服用してください。服用間隔は4時間以上あけてください。

年令	1回量	1日服用回数
11才以上	2カプセル	3回を限度とする
5才以上 11才未満	1カプセル	
5才未満	服用しないでください	

〔用法・用量についての注意〕

- (1) 定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (2) 5才以上の小児に服用させる場合には、服用量のまちがいや薬剤がのどにつかえることがないように、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方は、右図のようにカプセルの入っている PTP シートの凸部分を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、カプセルを取り出してください。
(誤ってシートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。)



成分・分量

2 カプセル (11才以上の 1 回服用量) 中、次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
日局 もく 木クレオソート	90 mg	大腸の過剰なぜん動運動の正常化、 腸管内の水分量の調整

添加物として、マクロゴール400、ポリソルベート80、コハク化ゼラチン、D-ソルビトール、グリセリン、カラメル、中鎖脂肪酸トリグリセリドを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器には絶対に入れかえないでください。
3. 本剤を開封後は、アルミ袋の折り線で折りまげ、必ずアルミ袋内で乾燥剤と共に保管してください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
5. 使用期限を過ぎたものは、服用しないでください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

大幸薬品株式会社 お客様相談係:電話 06-6382-1095
受付時間:午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話: 0120-149-931

製品の詳しい内容については、ホームページ(<http://www.seirogan.co.jp>)をご覧ください。

製造販売元

大幸薬品株式会社

〒564-0032 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号