

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

龍角散

第3類医薬品

意匠登録済
穴あきさじ



龍角散は、鎮咳去痰作用を活発にする生薬（キキョウ・セネガ・キョウニン・カンゾウ）を主成分としたのどの薬です。

人間の気管の内面には、繊毛細胞が一面にあり、その繊毛は1分間に約1,500回の速さで絶えず振動し、また気管の内壁からは粘液を分泌しています。気道を通して来たチリやホコリ、細菌などはこの粘液にとり込まれ、繊毛の振動によって体外に排出されます。これが自然の浄化作用です。

のどの使いすぎや喫煙、汚れた空気を吸ったりするとのが炎症を起して痛んだり、たんがからんだりして浄化能力がおとろえ、せきで苦しむことになります。こんなときに龍角散をのむと、キキョウ・セネガの有効成分サポニン配糖体が、気管内面からの粘液の分泌を高め、繊毛運動を活発にして、たんを取り去り、せきを鎮め炎症をやわらげます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 高熱の症状のある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5～6日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量


次の量を添付のさじ（山盛り1杯0.3g）で服用してください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 杯	3 ～ 6 回
11歳以上15歳未満	2 / 3 杯	
8 歳以上11歳未満	1 / 2 杯	
5 歳以上 8 歳未満	1 / 3 杯	
3 歳以上 5 歳未満	1 / 4 杯	
1 歳以上 3 歳未満	1 / 5 杯	
3 ヲ月以上 1 歳未満	1 / 10杯	
3 ヲ月未満	服用しないこと	


●龍角散は直接のどの粘膜に作用して、効果をあらわす薬です。

●必ず水なしで服用してください。


龍角散の服用方法



①さじを中ブタから切り離す。



②中ブタを開けて。



③さじに山盛りに取って。



④舌の上に薬をおき、ゆっくり溶かすようにしながらのどの方に運んで下さい。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

1.8g（大人1日量）中

成分	含量
キキョウ末（去痰作用）	70mg
キョウニン末（咳止め作用）	5.0mg
セネガ末（去痰作用）	3.0mg
カンゾウ末（咳止め作用）	50mg

添加物：炭酸Ca、リン酸水素Ca、炭酸Mg、安息香酸、香料

＜保管および取り扱い上の注意＞

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 株式会社 **龍角散** [お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12
電話 03-3866-1326 時間 10:00～17:00（土・日・祝日を除く）



株式会社 **龍角散**

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12