

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートアイストレッチ

第2類医薬品 目薬 12mL

抗ヒスタミン作用をもつクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。



⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人…緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量 1回1~2滴、1日5~6回点眼する。

●用法・用量に関連する注意 (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあるので用法・用量を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(5) 点眼用にのみ使用すること。

効能・効果 目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成分 ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%、L-アスペラギン酸カリウム 1%、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.02%、アラントイン 0.1%、ビリドキシン塩酸塩 0.1%、塩酸テトラヒドロゾリン 0.01% 添加物として、塩化Na、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 他の人と共用しないこと。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとて使用すること。(7) 容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問い合わせ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1