

〔効能効果〕きずの消毒・洗浄

〔用法用量〕そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1)用法用量を厳守してください。(2)顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(5)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕過酸化水素(H₂O₂) 2.5～3.5 w/v%を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない冷所(30℃以下)に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



キャップ：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PP

P

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

オキシドール



100mL

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

きずの消毒・洗浄に

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期運用しないでください

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号

使用期限

