

P

P

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

眼科用剤

第3類医薬品

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

3g×18包

### ⚠ 使用上の注意

#### 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください

2. 長期連用しないでください

#### 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

【効能効果】 結膜囊の洗浄・消毒

【用法用量】

2%以下の濃度で用いてください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(3) 混濁したものは使用しないでください。(4) 眼科用のみ使用してください。(5) 完全に溶解させてから使用してください。

【成分分量】

1 包中 日局ホウ酸 3g含有。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 溶かした後は速やかに使用してください。

〈貯法〉 密閉容器。室温保存。

【希釈方法】

2%液：本品1包(3g)をとり、水約150mLに溶かしてください。

第3類医薬品

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

3g×18包

眼科用剤

第3類医薬品

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

3g×18包

外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に



箱



分包：PE,セロハン



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626