

消毒用エタノールIP^{ケン}

第3類医薬品

■消毒用エタノールIP「ケンエー」500mL（スプレー式）のつけかえ用としてもご使用いただけます。

※必ず消毒用エタノールIP「ケンエー」500mL（スプレー式）のスプレーポンプをつけかえてください。
※スプレーポンプを装着する際は、容器に残っているリングを必ず取り除いてください。リングが付いたままスプレーポンプを装着すると、液漏れやスプレーが正常に作動しなくなるおそれがあります。
※つけかえ時は液はねや液だれに注意してください。



折りたたんで廃棄し
やすいボトルを採用

健栄製薬（株）お問い合わせ先
電話番号（06）6231-5822
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



キャップ：PP
バックン：PE,PP
ボト ル：PE
ラ ベル：PS,PET

P

飲用不可

消毒薬

第3類医薬品

消毒用エタノールIP^{ケン}

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ＊火気厳禁

500mL



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

手指・皮膚、
医療機器の消毒に

消毒用エタノールIP^{ケン}

第3類医薬品

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

消毒用エタノールIP「ケンエー」第3類医薬品

△ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮膚。
（2）目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効能効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

（右側面へ続くノ）



4 987286 200767

製造番号

使用期限

消毒用エタノールIP^{ケン}

第3類医薬品

（ノ左側面より続く）

＜用法用量に関連する注意＞

- （1）用法用量を厳守してください。
- （2）局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- （3）過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- （4）広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- （5）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- （6）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- （7）外用にのみ使用してください。

【成分分量】

エタノール（C₂H₅O）76.9～81.4 vol%を含有します。
添加物としてイソプロパノールを含有します。

＜成分に関連する注意＞

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。（アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。）

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）火気に近づけないでください。
- （5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- （6）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- （7）薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。（変質又は変色のおそれがあります。）

【貯法】

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。