

P

外用殺菌消毒薬

第2類医薬品

日本薬局方

クレゾールケン液

(クレゾール 42 ~ 52 vol%を含有)

Saponated Cresol Solution

500 mL



発売元
健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

製造販売元
株式会社 フヂミ製薬所
大阪市東成区中本2丁目9番9号

手指の殺菌・消毒、
便所などの殺菌・消毒に

【用法用量】

次のように水で希釈して洗浄してください。

- 1) 手指の消毒の場合：2%（本剤の50倍希釈）
- 2) 創傷面の消毒の場合：1%（本剤の100倍希釈）
- 3) 便所等の消毒の場合：3%（本剤の33倍希釈）

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) そのままの液又は濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流してください。なお、炎症が起きた場合には、医師の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】

1 mL中 クレゾール 0.5 mL含有（50 vol%）

添加物：ダイズ油、水酸化ナトリウム

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本剤のクレゾール臭の移行を避けるため、保管には注意してください。
- (6) 原液を取扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用してください。

【希釈方法】

- 33倍液：本剤を30 mLとり、水1 Lにうすめてください。
- 以下同様にうすめてください。
- 50倍液：本剤20 mLに水1 L
- 100倍液：本剤10 mLに水1 L

＜貯法＞

気密容器。遮光して室温保存。

製造
番号使用
期限

P

C

必ずうすめてご使用ください

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

- ☒ してはいけ
ないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目、目の周囲、粘膜（口唇等）
- (2) 広範囲の皮ふ、深い傷口

2. そのままの液では使用しないでください

相談する
こと

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5 ~ 6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

- 手指・創傷面の殺菌・消毒
- 便所、便器、ごみ箱、たんづぼ、浄化槽等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

金属：キャップ

ボトル：PE
外装フィルム：PP

第2類医薬品

日本薬局方

クレゾールケン液