

健栄 うがい薬 500mL

計量
カップ
付

第3類医薬品

細菌・真菌から
ウイルスまで殺菌・消毒
のどの殺菌・消毒 口臭除去



©meiji ad

うがい以外に使用しないでください

ポンプの使い方

- ① ノズル先端を
カップの中に入れて
- ② ゆっくりと
しっかり下まで
押しきってください



1回分 2~4 押し

1押し=約1mL

液の
飛び散り
ご注意

- ポンプは最後まで押しきらないと、正しく計量できず、**液ダレの原因**にもなります。
- カップからの液のはね返りにご注意ください。
- 液の飛び散りを防止するため、ノズル先端に液が付着した場合は、清潔なガーゼや布等でふきとってください。

この製品はボトルの外側を透明フィルムで包んでいます。

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください

第3類医薬品 健栄うがい薬

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。
【相談すること】 ① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 口内のひどい下痢のある人。(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③ 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分・分量 1mL中 ポビドンヨード 70mg (有効ヨウ素として 7mg) ● 添加物として、エタノール、l-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。
【成分・分量に関連する注意】 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号 (06) 6231-5822
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

用法 用量 1回、本剤 2~4mL を水 約60mL に
うすめて、1日数回うがってください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤は使用する時にうすめて、早めに使用してください。(5) 定められた用法、用量を厳守してください。

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 衣服等に付着すると着色しますので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

容器の使い方 ① 使用開始時は、ポンプのストッパーを取り外して、薬液が出るまでポンプを数回押す。② 計量カップを傾けて、ポンプを2~4押し分または、カップの「2」と「4」の目盛りの間まで(2~4mL)うがい薬を入れる。③ 計量カップを水平にして「60」の線まで水を入れてうすめる。● 持ち運び時は必ずボトル部分を持ってください。(計量カップがはずれ、ボトルが落下する恐れがあります)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931



製造番号(上)・使用期限(下)は
底面に記載
ボトル:PE
ポンプ:PP,PE
カップ:PP
ストッパー:PP
外装フィルム:PE