

効能効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法用量

- 1 日数回、適量を患部に噴射塗布してください。
〈用法用量に関連する注意〉
- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) のどや口内の患部の塗布用によりのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、のどに使用する場合には、ノズルをのどの患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

成分量

100 mL 中
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 20 mg、セチルピリジニウム塩化物水和物 300 mg 含有添加物：グリセリン、プロピレングリコール、L-メントール、サッカリンナトリウム水和物、ヒドロキシエチルセルロース、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、エタノール、サリチル酸メチル、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にノズルカバーをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本剤使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

健栄製薬（株）お問い合わせ先

電話番号（06）6231-5822



受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



健栄製薬株式会社


大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

使用法



※最初は液が出るまで数回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。

のどの
痛み・はれ、
口内炎に

健栄
のど
スプレー
アズレン

さわやかミント味 30 mL



ノズルカバー付だから
携帯に便利

第3類医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

口腔咽喉薬

第3類医薬品

販売名：健栄のどスプレーアズレン

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 口内のひどい化膿のある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感
消化器	胃部不快感、吐き気

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



製造番号

使用期限